

## 【インフルエンザ予防接種Q/A】

1. 鼻水、咳が出ています。微熱（37.4度）がありますが接種できますか。

咳や鼻水が出ていても症状が軽い場合は接種できます。  
明らかな発熱（通常 37.5℃以上）でなければ接種できます。

2. 耳鼻科で処方された抗生剤を飲んでいますが接種できますか。

接種できます。

3. 水痘が治って2週間ですが接種できますか。

麻疹は治癒後4週間、水痘・風疹は2週間で接種できます。  
その他の疾患は本人の体調が良ければ1週間で接種できます。

4. 水痘の子と接触して潜伏期間中のようなのですが接種できますか。

インフルエンザ等不活化ワクチンは接種できます。  
生ワクチンは感染可能のウイルスと競合して免疫ができにくい状況があるので、延期する場合があります。

5. 4週間前に熱性けいれんを起こしました。接種できますか。

通常の子発熱後は2~3ヶ月後から接種できます。

単純性熱性けいれんは、小児科専門医が可能と判断すれば2週間で接種できます。

6. 4種混合ワクチン接種から1週間以内ですが接種できますか。

不活化ワクチン後は1週間、生ワクチン後は4週間経過しないと接種できません。

7. 卵アレルギーですが接種できますか。

問診上必要なら、アレルギー検査を行ってから接種しております。

8. 昨年接種部位がひどく腫れましたが接種できますか。

場合により接種量を減らして接種しております。

インフルエンザの流行は毎年12月～2月初旬がピークとなります。

11月末までに1回目のワクチン接種を受けましょう。